

組合員 各位

山形農業協同組合

2025年用JAやまがた農作物病害虫防除暦の記載内容の変更について

防除暦の記載内容に不備がありました。正しくは下記の通り変更になりますので通知いたします。

ページ数 21ページ
品目 西洋なし
変更内容 6月上旬 コルト顆粒水和剤 注意事項追加

(誤)

6月 上旬	輪紋病 黒星病 カメシ類・アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 チャノキアザミウマ	①	ドキリンフロアブル 1,000倍 (100ml)	3日前まで 9回以内	400 ^g / _{ドル}	1 さくらんぼの隣接園ではドキリンフロアブルにかえて、インダーフロアブル5,000倍 (7日前まで/3回以内)を散布する。 2 散布薬剤が樹冠内に十分入るように、徒長枝の整理は早めに行う。	/	
		②	②テルスターフロアブル 3,000倍 (33ml)	前日まで 2回以内				
		③	コルト顆粒水和剤 3,000倍 (33g)	前日まで 3回以内				
		④	バイカルティ 1,000倍 (100g)	-				



(正)

6月 上旬	輪紋病 黒星病 カメシ類・アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 チャノキアザミウマ	①	ドキリンフロアブル 1,000倍 (100ml)	3日前まで 9回以内	400 ^g / _{ドル}	1 さくらんぼの隣接園ではドキリンフロアブルにかえて、インダーフロアブル5,000倍 (7日前まで/3回以内)を散布する。 2 散布薬剤が樹冠内に十分入るように、徒長枝の整理は早めに行う。 3 コルト顆粒水和剤は西洋なしの品種ルレクチエでは落花後から袋かけ前までの散布については果実に薬斑を生じるおそれがあるので使用をさける。	/	
		②	②テルスターフロアブル 3,000倍 (33ml)	前日まで 2回以内				
		③	コルト顆粒水和剤 3,000倍 (33g)	前日まで 3回以内				
		④	バイカルティ 1,000倍 (100g)	-				